EN PRATIQUE

Qui peut vacciner ?

- Votre **médecin traitant** ;
- L'**équipe de Promotion de la Santé à l'École** ;
  L'équipe vérifie le statut vaccinal des élèves à chaque bilan de santé.
  Selon les âges, elle peut proposer une vaccination prévue dans le calendrier vaccinal ou un rattrapage ; ou vous proposer de prendre contact avec votre médecin traitant.

Qu'allez-vous payer ?

- Les vaccins sont **gratuits** s'ils sont commandés par le professionnel de santé dans le cadre du Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
- Seuls les éventuels **frais de consultation** chez le médecin traitant sont à votre charge.
- **Vous n'aurez aucun frais** dans le cadre de la Promotion de la Santé à l'Ecole.

FOCUS

La coqueluche, une maladie encore bien présente chez nous.

- La coqueluche est une **maladie très contagieuse**, transmise par voie aérienne. Elle est causée par une bactérie.
- La coqueluche met de **7 à 10 jours** avant de se déclarer. Les symptômes sont: nez qui coule, fièvre et toux qui peut être persistante et peut évoluer en épisodes de toux violente (quintes de toux). Les symptômes durent habituellement de 6 à 10 semaines.
- Les **complications** de la maladie sont: otite, pneumonie, convulsions, encéphalite, hernie ou fracture de côtes suite aux quintes de toux.

  La maladie est **particulièrement sévère**, et peut être mortelle, **chez les nourrissons** dans les premiers mois de vie.
- Une personne peut faire **plusieurs fois la coqueluche** au cours de sa vie. La protection donnée par le vaccin ou par la maladie persiste seulement quelques années.
- Souvent, ce sont les adolescents et les adultes qui contaminent les nourrissons. Il est donc important d'effectuer des rappels de la vaccination tant pour sa propre protection que pour protéger les autres.

Pour plus d'informations, consultez votre médecin traitant ou le site : www.vaccination-info.be

e-vax

Le système de commande de vaccins, et d'encodage des données vaccinales, utilisé par les vaccinateurs dans le cadre du Programme, se nomme e-vax.

Ce système permet d'enregistrer les dates de vaccination et de constituer le registre vaccinal permettant le suivi de votre vaccination.

Les données sont gérées dans le respect de la loi relative à la protection de la vie privée.

Si vous ne souhaitez pas que vos données vaccinales soient encodées, informez-en votre vaccinateur.

Editeur responsable: Benoît Parmentier - Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles - DOCDE0021 - D/2019/74.80/38

ONE OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE
Chaussée de Charleroi 95 - 1060 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 542 12 11 / Fax : +32 (0)2 542 12 51
info@one.be - ONE.be

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

VACCINATION-INFO.BE

15/16 ans

A CHAQUE ÂGE SA VACCINATION !

La vaccination à 15-16 ans

Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles

édition 2019

Pourquoi vacciner ?

- *Pour se protéger contre certaines maladies.*
  Les vaccins contiennent des fragments d'un virus ou d'une bactérie, ou une faible quantité de ceux-ci tués ou affaiblis.
  Grâce aux vaccins, le système immunitaire se prépare à les reconnaître et à les combattre. S'il les rencontre encore une fois, il pourra plus facilement les neutraliser.

- *Pour protéger les autres contre certaines maladies.*
  Quelques personnes ne peuvent pas être vaccinées : nourrissons trop jeunes, personnes pour lesquelles c'est médicalement contre-indiqué.
  Plus il y a de personnes vaccinées contre une maladie, moins le virus ou la bactérie circulent dans la population, ce qui protège notamment les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées.

Des réactions sont-elles possibles ?

Certains effets indésirables sont possibles. Ils sont généralement **sans gravité**: rougeurs, légère douleur à l'endroit où l'injection du vaccin est faite et fièvre de courte durée.
Ces réactions disparaissent après quelques jours au maximum.

Pour plus d'informations, consultez votre médecin traitant ou le site: **www.vaccination-info.be**

Calendrier de vaccination 2019-2020

		Nourrissons					Enfants et adolescents			
		8 sem. (2 mois)	12 sem. (3 mois)	16 sem. (4 mois)	12 mois	15 mois	5-6 ans	11-12 ans	13-14 ans	15-16 ans
Poliomyélite	Hexavalent	✓	✓	✓		✓	✓			✓
Diphtérie	Hexavalent	✓	✓	✓		✓	✓			✓
Tétanos	Hexavalent	✓	✓	✓		✓	✓			✓
Coqueluche	Hexavalent	✓	✓	✓		✓	✓			✓
Haemophilus influenza de type b	Hexavalent	✓	✓	✓		✓	✓			✓
Hépatite B	Hexavalent	✓	✓	✓		✓	✓			✓
Rougeole	RRO				✓			✓		
Rubéole	RRO				✓			✓		
Oreillons	RRO				✓			✓		
Méningocoque C						✓				
Pneumocoque		✓	(✓)	✓	✓					
Rotavirus (vaccin oral)		✓	✓	(✓)						
Papillomavirus (HPV)									✓ ✓ ①	

✓ Recommandé à tous et gratuit

✓ Recommandé à tous, remboursé mais pas gratuit

Vaccin combiné (une seule injection)

① vaccination en 2 doses à 6 mois d'intervalle (minimum 5 mois d'écart)

Hexavalent : vaccin qui confère une protection contre 6 maladies.

Ce calendrier est susceptible d'être modifié au fil des ans.
Votre médecin pourra éventuellement l'adapter à votre enfant, n'hésitez pas à discuter vaccination avec lui.

Quels vaccins sont recommandés à 15 - 16 ans ?

1 injection d'un vaccin contre **la diphtérie, le tétanos et la coqueluche**.

En retard de vaccination ?

Un **rattrapage** en 1 injection pour les jeunes **n'ayant pas encore reçu** les 2 doses de vaccin contre la rougeole-rubéole-oreillons **(RRO)**.

Un **rattrapage** pour toutes les filles **n'ayant pas encore reçu** le vaccin contre le papillomavirus humain **(HPV)**.

Un **rattrapage** pour tous les jeunes qui ne sont pas vaccinés contre l'**hépatite B**.